

消毒液の作り方

塩化ベンザルコニウム液（逆性石けん）編


消毒の対象となるものが、色あせ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない場合には、逆性石けんが有効です。

商品名（例）：オスバン、ザルコニン、カネトール等

消毒液を使用する場所・物：食器類、流し台、浴槽、家具類、床

- ①最初に消毒液（10%濃度）を入れる。
- ②容器がいっぱいになるまで水を入れて、よく混ぜる。

0.1%希釈の簡易的な方法



1 Lのペットボトルの場合



10 Lのバケツの場合

消毒液を取扱う際の注意点

- ・泥や汚れが残っていると消毒効果が低下するため、汚れをよく洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから十分に乾燥させ、その後、希釈した消毒液を浸した布などでよく拭いてください。
- ・希釈した消毒液は、その都度使い切りましょう。
- ・作業時には、長袖、長ズボンを着用し、ゴーグル、マスク、ゴム手袋などを使用し、消毒薬が皮膚や目にかからないように注意してください。

問合せ先

氷見市 健康・医療対策課
高岡厚生センター氷見支所

TEL:0766 - 74 - 8062
TEL:0766 - 74 - 1780

