

水害時の消毒方法一覧(緊急時対応消毒薬剤)

注意！ 薬剤の原液は皮膚につけないようにしてください。

消毒対象	消毒薬	調整方法	使用方法
屋内 汚水に浸かった壁面や床、家財道具	逆性石けん液 ・ベンザルコニウム塩化物液 ・オスバン ・ホエスミン ・クレミール * 裏面にペットボトルを使った消毒剤の作り方を記載しています。	100倍にうすめて使用する。 作り方 薬剤10mℓに水を加えて1ℓにする。 薬剤量の目安 キヤップ1杯は約5mℓ	泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、うすめた液をひたした布などでよく拭く。
屋外 し尿槽等から汚物があふれた場所 動物の死骸や腐敗物が漂着した場所 氾濫した汚水が付着した壁面 乾燥しにくい床下 * 道路冠水などは水洗いをして、直射日光による自然乾燥を行う。		通常汚染の場合、100倍にうすめて使用する。し尿等で汚染度の高い場合は、 50倍 くらいにうすめて使用する。 作り方 薬剤 20mℓ に水を加えて1ℓにする。 (通常汚染の場合は10mℓ使用) 薬剤量の目安 キヤップ1杯は約5mℓ	家屋の周りは、じょうろや噴霧器などで、濡れるようにまく。 壁面は、泥などの汚れを水で落としてから、消毒薬をひたした布などでよく拭く。 (噴霧器を使う場合は、濡れる程度に噴霧する。)
手指 後片付けなどで汚染された箇所や土に触れた手指		100倍にうすめて使用する。 作り方 薬剤10mℓに水を加えて1ℓにする。 薬剤量の目安 キヤップ1杯は約5mℓ	汚れを石けんで洗った後、流水で石けんを落とし、洗面器などに入れた消毒薬に手首まで浸し、30秒以上もみ洗いする。 その後、乾いたタオルなどでよく拭き取る。
食器類		次亜塩素酸ナトリウム ・ハイター ・ピューラックス ・ミルトン	300倍にうすめて使用する。 作り方 薬剤3mℓに水を加えて1ℓにする。 薬剤量の目安 キヤップ1杯は約6mℓ
注意事項 ・作業時には、長袖、長ズボンを着用し、メガネ、マスク、ゴム手袋などを使用し、消毒薬が皮膚や目にかからないように注意すること。 ・皮膚に薬剤の原液がついた場合は、大量の水と石けんでよく洗い流すこと。目に入った場合は、水で15分以上洗い流し、医師の診察を受けること。 ・他の消毒薬や洗剤などと混ぜないこと。(有害ガスが発生する恐れがあります。) ・薬剤は使用する直前にうすめ、濃度を守ること。また、他の容器に移して保管しないこと。(作った消毒薬は使い切ること。) ・浄化槽内には散布しないこと。			

※金属には使用しない。